

- 16' Fühler kürzer, gegen die Spitze deutlicher verdickt, ihr Endglied kurz eiförmig, sehr wenig länger als breit. Oberseite in den Zwischenräumen wenig lang aufstehend behaart.
- 17'' Körper schwach gewölbt, oben leicht abgeflacht. Arten aus Syrien.
- 18'' Long. 5—5,4 mill. Augen gröfser, deutlich vorragend. — Cypem *syriaca* Baudi.
- 18 Long. 3—4 mill. Oberseite deutlicher behaart, Augen klein, sehr wenig vorragend. — Syrien (Haifa, Beirut etc.) . . . *parvula* Reitt.
- 17' Körper leicht gleichmäfsig gewölbt, oben nicht abgeplattet. Arten aus Südost-Europa (Dalmatien, Griechenland, Türkei, Kreta).
- 19'' Gröfser (Long. 4—5 mill.), weniger gewölbt, Kopf und Halsschild dichter, ziemlich fein punktirt, Augen klein. (*L. Marthae* Reitt.) *ferruginea* Küst.
- 19' Klein (Long. 3—4 mill.), gewölbter, Kopf und Halsschild fein und spärlich punktirt, Augen sehr klein. (*L. Krüperi* Reitt.)
v. *minima* Motsch.

Dryocoetes baikalicus nov. sp.

Dem *D. autographus* Ratz. und *villosus* Fabr. sehr ähnlich, kleiner und dunkler als der erstere, der Thorax länger, oben dichter und stark körnig punktirt, die Fld. mit feineren Punktstreifen, die Punkte derselben dichter gestellt, ebenso die Zwischenraumreihen dichter und feiner, an der Basis dicht irregular punktirt; von *villosus* durch die weifse, kürzere, wie beim *autographus* gestaltete Behaarung, gedrungeneren Körperbau, feine Punktstreifen der Fld., deren Hauptreihen von den Zwischenraumreihen an den Seiten durchaus gleich gebildet sind, verschieden. — Long. 3 mill.

Im Quellgebiet des Irkut. Von Leder aufgefunden.

E. Reitter.
